

Reinigungs- und Hygiene-Empfehlung für die Benutzung von Orgeln durch mehrere Personen (nach TRBA 500)

| Was | Wer | Wann | Wie | Womit |
|--|------------------------------------|---|---|---|
| Händereinigung (sofern keine hygienische Händedesinfektion durchgeführt wird) | alle Benutzer | vor und nach der Benutzung (Gottesdienst, Übe-/Unterrichtszeit) | Flüssigseife aus dem Spender auf die feuchten Hände geben und ca. 20 - 30 Sekunden verreiben, gründlich abspülen und mit Einmalhandtüchern sorgfältig abtrocknen. | Waschlotion |
| Hautpflege | alle Benutzer | bei häufiger Händereinigung täglich | Nach Entnahme aus der Spenderflasche bzw. -tube in die Haut einmassieren. | Geeignetes Hautpflegeprodukt |
| Hygienische Händedesinfektion | alle Benutzer | bei Bedarf (z. B. Risikogruppen, in Gesundheitseinrichtungen, Heimen), ggf. zusätzlich zur Händereinigung | Desinfektionsmittel in ausreichender Menge (ca. 3 - 5 ml) aus dem Spender entnehmen und ca. 30 Sekunden in die trockenen Hände einreiben. Kein Wasser verwenden. | z. B. Sterillium oder Händedesinfektionsmittel laut WHO |
| Flächenreinigung Klaviaturen, Registerzüge/-schalter, sonstige Kontaktflächen (z. B. Türklinken) | zuständiges Personal bzw. Benutzer | nach Bedarf, nicht zu häufig höchstens täglich | Feucht-Wisch-Methode ggf. desinfizierend abwischen, Nicht zu feucht! Nicht sprühen! | Wasser; leicht angefeuchtetes Tuch, ggf. mit wenig Alkohollösung (zuvor an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen!) Trocken nachwischen |
| Raumlüftung | jeweilige Mitarbeiter | 4 x täglich und nach Bedarf | Stoßlüftung | über Fenster |
| Sanitärräume / Waschbecken | zuständiges Personal | täglich oder nach Bedarf | Feucht-Wisch-Methode, ggf. desinfizierend abwischen | Sanitärreinigungsmittel lt. Gebrauchsanweisung |

"Ob eine Desinfektion von bestimmten Flächen außerhalb von Gesundheitseinrichtungen überhaupt notwendig ist, sollte im Einzelfall anhand der tatsächlichen Kontamination der Fläche entschieden werden. Im Fokus stehen sollten in diesem Falle die Kontamination durch respiratorische Sekrete sowie ggf. Oberflächen, die häufigen Kontakt mit den Händen einer erkrankten Person hatten. Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch der häufigen Kontaktflächen, wird auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl. Davon unbenommen sind Situationen, in denen an COVID-Erkrankte im häuslichen Umfeld versorgt werden." (Robert-Koch-Institut: Hinweise zu Reinigung und Desinfektion von Oberflächen außerhalb von Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, Stand: 4.4.2020)